



Abteilung
Natur
und Landschaft

Ripartizione
Natura
e paesaggio

Streuwiese

Nur »Streuwiese«? Die überaus artenreichen Feuchtwiesen weisen viele Pflanzen auf, die selten oder gefährdet sind. Der Futterwert der Sauergräser ist gering. Daher wird das Mähgut meist nur als Streu für die Tiere verwendet.

Streuwiesen und Niedermoore sind Über-gangszonen zwischen Wasser und Land. Sie entstehen zumeist durch Verlandung von Seen. Auf den vernässten, sauren Böden wachsen speziell angepasste Pflanzen. Moore sind wichtige »Naturarchive«. Unter Luftab-schluss bleiben Pflanzenteile und Blütenstaub über Jahrtausende in den Torf-schichten erhalten. Jede Schicht entspricht einer bestimmten Zeit. Mit der Pollenanalyse lassen sich die Art und Häufigkeit der Pflanzen be-stimmen und Rückschlüsse ziehen auf Besied-lungsgeschichte und naheiszeitliches Klima.



Prato da strame

Solo prati da strame? I prati umidi, straor-dinariamente ricchi di varietà vegetali, ospitano molte piante rare o a rischio di estinzione. L'utilizzo delle carici come foraggio è solo modesto. Ecco perché lo sfalcio trova spesso impiego, in stalla, come strame per gli animali (prato da strame).

I prati umidi e le torbiere basse sono zone di transito fra gli spazi acquatici e quelli terrestri. La loro origine è legata al prosciugamento di specchi lacustri. Sui suoli acidi, impregna-ti d'acqua, crescono piante adattatesi specificatamente a questi ambienti. Le torbiere fungono dunque da preziosissimi archivi naturali. In condizioni anossiche, le parti delle piante e il polline dei fiori si conservano anche per millenni, ingloba-ti negli strati di torba. Ogni strato coincide con un determina-to intervallo storico. L'analisi pollinica consente di stabilire la frequenza e diffusione delle piante e trarre indizi sulla storia degli insediamenti e sulle condizioni climatiche regnanti sul-la Terra in epoca post-glaciale.



Schilf, Rohrkolben sowie Seggen und Binsen wachsen vom Ufer aus immer weiter ins Wasser hinein.

Dalla riva, la vegetazione di canne, tife, carici e giunchi tende a spostarsi sempre di più verso l'acqua.

Bachungen-Ehrenpreis
Veronica beccabunga



Dunkle Akelei
Aquilegia scura



Der Fieberklee wächst im dauernd überfluteten Bereich.

Il trifoglio fibrino cresce in aree costantemente allagate.



Der Kiebitz war früher auch Brutvogel, heute ist er nur noch Gast auf der Durchreise.

La pavoncella era, in passato, anche nidificante in questi ambienti mentre oggi la specie si osserva solo di passaggio.

Mehlprimel
Primula farinosa



Kaisermantel / *Pafía*



Sumpfdotterblumen bringen im Frühjahr die ersten Farbtupfer in die braune Landschaft.

La calta palustre è la pianta che, in primavera, propone allegre macchie di colore nel paesaggio ancora bruno.



Zebraspinne / *Vespa zebra*

